

# Dequadin®

## FOGLIO ILLUSTRATIVO: INFORMAZIONI PER L'UTILIZZATORE

Dequadin 0,5% soluzione per mucosa orale

Dequadin 0,5% spray per mucosa orale

Dequalinio cloruro

**Legga attentamente questo foglio prima di usare questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.**

Usi questo medicinale sempre come esattamente descritto in questo foglio o come il medico o il farmacista le ha detto di fare.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se desidera maggiori informazioni o consigli, si rivolga al farmacista.
- Se si manifesta uno qualsiasi degli effetti indesiderati, tra cui effetti non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.
- Si rivolga al medico se non nota miglioramenti o se nota un peggioramento dei sintomi.

### Contenuto di questo foglio:

1. Che cos'è Dequadin e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di usare Dequadin
3. Come usare Dequadin
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare Dequadin
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

## 1. Che cos'è Dequadin e a cosa serve

Dequadin contiene il principio attivo dequalinio cloruro (detto anche decametilen bis aminochinaldina cloruro), ed è un farmaco antibatterico a vasto spettro ed antifungino (antimicotico).

È attivo contro i batteri Gram positivi e Gram negativi, su *Borrelia vincenti*, *Candida albicans* e alcune specie di *Tricophyton*. Dequadin si usa nel trattamento topico (locale) di gengiviti (infiammazioni della gengive), stomatiti (infiammazioni della bocca), tonsilliti (infiammazioni delle tonsille) e faringiti (infiammazioni della faringe). Dopo le estrazioni dentarie Dequadin è utile nella prevenzione delle infezioni.

## 2. Cosa deve sapere prima di usare Dequadin

### Non usi Dequadin

- se è allergico al dequalinio cloruro o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6);
- se sta usando altri antisettici o detergenti per l'igiene orale;
- in caso di bambini sotto i tre anni, soprattutto se predisposti al laringospasmo (contrazione spasmodica dei muscoli della laringe) o alle convulsioni (contrazioni involontarie dei muscoli).

### Avvertenze e precauzioni

Si rivolga al medico o al farmacista prima di usare Dequadin. Dequadin deve essere utilizzato solo per lesioni della bocca e della gola. L'utilizzo di Dequadin, soprattutto se prolungato, può dare origine a fenomeni di sensibilizzazione al farmaco o di resistenza da parte di microrganismi. Se ciò si verifica sospenda il trattamento e si rivolga al medico. Si rivolga al medico se non nota miglioramenti o se nota un peggioramento dei sintomi. Dequadin può essere assunto senza rischio dai soggetti affetti da celiachia.

### Bambini

Dequadin non deve essere utilizzato nei bambini di età inferiore ai 3 anni, soprattutto se predisposti al laringospasmo (contrazione spasmodica dei muscoli della laringe) o alle convulsioni (contrazione involontaria dei muscoli).

### Altri medicinali e Dequadin

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale. In particolare, informi il medico o il farmacista se sta assumendo altri antisettici o detergenti per l'igiene orale.

### Gravidanza e allattamento

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno chiedi consiglio al medico o al farmacista prima di usare questo medicinale.

### Guida di veicoli e utilizzo di macchinari

Non sono noti effetti sulla capacità di guidare veicoli o di utilizzare macchinari.

Dequadin contiene propilene glicole, che può causare irritazione cutanea.

## 3. Come usare Dequadin

Usi questo medicinale seguendo sempre esattamente quanto riportato in questo foglio o le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

### ADULTI:

La dose raccomandata è di 1 applicazione locale ogni 2 o 3 ore.

### BAMBINI DI ETÀ SUPERIORE AI 3 ANNI:

La dose raccomandata è da 2 a 5 applicazioni locali al giorno.

Per infezioni di media o lieve gravità, può utilizzare Dequadin soluzione per mucosa orale, come collutorio o per fare gargarismi: diluisca 10-20 gocce di soluzione in un bicchiere d'acqua 3 volte al giorno. Si consiglia di tenere aperta la bocca e di non inghiottire la saliva per qualche minuto dopo l'applicazione, in questo modo si ottiene una maggiore efficacia terapeutica. Non superare le dosi raccomandate senza il consiglio del medico. Usare solo per brevi periodi di trattamento.

### MODO DI SOMMINISTRAZIONE:

**Dequadin soluzione** per mucosa orale: utilizzare un pennello o un batuffolo di ovatta avvolto intorno ad un bastoncino.

**Dequadin spray** per mucosa orale: utilizzare l'apposito erogatore spray. Prema più volte il tasto della pompetta erogatrice fino ad ottenere lo spray. Successivamente diriga il tubo diffusore e applichi il prodotto sulla zona da trattare.

### Se usa più Dequadin di quanto deve

In caso di ingestione accidentale di una dose eccessiva di Dequadin, informi il medico.

### Se dimentica di usare Dequadin

Non usi una dose doppia per compensare la dimenticanza della dose.

### Descrizione dell'aspetto di Dequadin e contenuto della confezione

Dequadin soluzione per mucosa orale si presenta in forma di fialone in vetro ambrato da 28 ml. Dequadin spray per mucosa orale si presenta in forma di fialone in vetro ambrato da 10 ml con erogatore spray meccanico senza gas.

### Se interrompe il trattamento con Dequadin

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

## 4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino. Durante il trattamento con Dequadin può manifestarsi irritazione locale.

### Segnalazione degli effetti indesiderati

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite l'Agenzia Italiana del Farmaco all'indirizzo:

<http://www.agenziafarmaco.gov.it/irresponsabili>.

Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

## 5. Come conservare Dequadin

Tenere questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini. Non conservare a temperatura superiore ai 30°C. Non conservare a temperatura inferiore a 8°C. Conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dall'umidità. Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla scatola. La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese. Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chiedi al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

## 6. Contenuto della confezione e altre informazioni

### Cosa contiene Dequadin

- Il principio attivo è dequalinio cloruro (detto anche decametilen bis aminochinaldina cloruro);
- Gli altri componenti sono propilene glicole, alcool etilico, saccarina, acqua depurata, alcool benzilico, aroma rosa, olio essenziale di geranio.

### Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Eurospital S.p.A. - Via Flavia 122 - 34147 Trieste - Italia

### Produttore

Doppel Farmaceutici S.r.l. - Via Martiri delle Foibe, 1  
29016 Cortemaggiore (PC) - Italia