

Simegut bambini, gocce orali, emulsione

Simeticone

Categoria Farmacoterapeutica

Antimeteorico (favorisce l'eliminazione dei gas che si formano nel tratto gastrointestinale).

Indicazioni terapeutiche

Simegut si usa nel trattamento sintomatico del meteorismo gastroenterico e dell'aerofagia del lattante e del bambino.

Controindicazioni

Ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti.
Generalmente controindicato in gravidanza (vedere Avvertenze speciali).

Precauzioni per l'uso

Non superare le dosi consigliate.
Dopo un breve periodo di trattamento (7 giorni) senza risultati apprezzabili consultare il medico.

Interazioni

Non sono note, né sono state segnalate, interazioni con altri farmaci.

Avvertenze speciali

Le gocce contengono para-idrossibenzoati che possono provocare reazioni allergiche (anche ritardate).

Gravidanza.

Non vi sono dati adeguati sull'uso di Simegut nelle donne in gravidanza, pertanto non dovrebbe essere usato in gravidanza a meno di una reale necessità e dopo valutazione del rischio/beneficio da parte del medico.

Allattamento.

Non è noto se il simeticone venga escreto nel latte materno. La decisione se continuare/interrompere l'allattamento o continuare/interrompere la terapia a base di simeticone dovrebbe essere presa tenendo in considerazione il beneficio dell'allattamento per il neonato e della terapia a base di simeticone per la donna.

Dose, modo e tempo di somministrazione

Lattanti e bambini: 20 gocce (= 0,6 ml) 2-4 volte al giorno dopo i pasti o altrimenti secondo prescrizione medica.
Agitare bene prima dell'uso. Le gocce vanno disperse in poca acqua.

Sovradosaggio

Non sono riportati fenomeni di sovradosaggio con l'uso di Simegut.

Effetti indesiderati

Non sono stati messi in evidenza effetti indesiderati dovuti a Simegut.
Il medicinale non è controindicato per i soggetti affetti da malattia celiaca.

Il rispetto delle istruzioni contenute nel foglio illustrativo riduce il rischio di effetti indesiderati. E' importante comunicare al medico o al farmacista la comparsa di qualsiasi effetto indesiderato.

Scadenza e conservazione

Scadenza: vedi la data di scadenza riportata sulla confezione.

Il periodo di validità si intende per il prodotto in confezionamento integro correttamente conservato.

Attenzione: non utilizzare il medicinale dopo la data di scadenza riportata sulla confezione.

Tenere il medicinale fuori dalla portata e dalla vista dei bambini.

Composizione

1 ml di emulsione contiene:

Principio attivo: simeticone 66,6 mg.

Eccipienti: idrossipropilcellulosa, carbopol, metile p-idrossibenzoato, propile p-idrossibenzoato, acido citrico, essenza di banana, acqua depurata.

Forma farmaceutica

Gocce orali, emulsione; flacone da 30 ml

Titolare AIC

Marco Antonetto Farmaceutici SpA - Via Arsenale
29 - 10121 Torino - I

Produttore e controllore finale

S&B Srl - Via del Mare 36 - Pomezia (ROMA) - I

Revisione del foglio illustrativo da parte dell'Agenzia Italiana del Farmaco

Determinazione AIFA dell'ottobre 2007