

## Foglio illustrativo: informazioni per l'utente

### **PAIDOFEN Bambini 100mg/5ml sospensione orale gusto fragola senza zucchero** **PAIDOFEN Bambini 100mg/5ml sospensione orale gusto arancia senza zucchero**

Ibuprofene

**Legga attentamente questo foglio prima di prendere / dare al suo bambino questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.**

Prenda / dia al suo bambino questo medicinale sempre come esattamente descritto in questo foglio o come il medico o il farmacista le ha detto di fare.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se desidera maggiori informazioni o consigli, si rivolga al farmacista.
- Se si manifesta uno qualsiasi degli effetti indesiderati, tra cui effetti non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.
- Si rivolga al medico se non nota miglioramenti o se nota un peggioramento dei sintomi dopo:
  - 3 giorni.
  - 24 ore nei bambini di età inferiore a 6 mesi

#### **Contenuto di questo foglio**

1. Cos'è PAIDOFEN e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di usare PAIDOFEN
3. Come usare PAIDOFEN
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare PAIDOFEN
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

#### **1. Cos'è PAIDOFEN e a cosa serve**

PAIDOFEN contiene ibuprofene che appartiene ad un gruppo di medicinali chiamati farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS) la cui azione permette di ridurre il dolore, la febbre e l'infiammazione.

Questo medicinale è indicato per il trattamento dei sintomi della febbre e del dolore lieve o moderato.

Si rivolga al medico se non si sente meglio o se si sente peggio dopo 3 giorni.

#### **2. Cosa deve sapere prima di usare PAIDOFEN**

##### **Non prenda/non dia al suo bambino PAIDOFEN:**

- se è allergico all'ibuprofene o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6);
- se il bambino ha meno di 3 mesi di età oppure se pesa meno di 5,6 kg (Vedere il paragrafo "Come usare PAIDOFEN");
- se è allergico a medicinali come l'acido acetilsalicilico oppure ad altri medicinali simili (analgesici, antipiretici, antinfiammatori non steroidei), soprattutto se si sono verificati problemi al naso come poliposi nasale e asma (Vedere il paragrafo "Avvertenze e precauzioni");
- se soffre di ulcera allo stomaco (ulcera peptica attiva);
- se soffre di una grave malattia dei reni o del fegato (insufficienza renale o epatica);
- se soffre di una grave malattia del cuore (insufficienza cardiaca);
- se ha sofferto in passato di perdita di sangue (emorragia), perforazione dello stomaco o dell'intestino oppure se ha sofferto in modo ricorrente di emorragia o di ulcera dello stomaco (due o più episodi distinti di dimostrata ulcerazione o sanguinamento);
- se è in trattamento con altri medicinali antinfiammatori (FANS, compresi gli inibitori specifici della COX-2) (Vedere i paragrafi "Avvertenze e precauzioni" e "Altri medicinali e PAIDOFEN");
- se è in gravidanza o allattamento.

## **Avvertenze e precauzioni**

Si rivolga al medico o al farmacista prima di assumere o somministrare PAIDOFEN al suo bambino se:

- soffre o ha sofferto di allergia ai medicinali che si usano per trattare la febbre, il dolore e l'infiammazione (antinfiammatori non steroidei) e se soffre di difficoltà a respirare (asma), polipi nel naso o angioedema)
- sta assumendo altri farmaci utilizzati per il trattamento del dolore, per abbassare la febbre e/o per curare l'infiammazione (antinfiammatori non-steroidi, FANS compresi inibitori della COX-2) (vedere paragrafo "Altri medicinali e PAIDOFEN");
- ha sofferto di disturbi allo stomaco e all'intestino (storia di ulcera), soprattutto se complicati da sanguinamento o perforazione in quanto si può verificare un aumento di emorragie e perforazioni gastrointestinali. In questi casi, il medico le consiglierà di iniziare il trattamento con la più bassa dose disponibile ed eventualmente l'uso concomitante di medicinali che proteggono lo stomaco (misoprostolo o inibitori di pompa protonica). Questo deve essere considerato anche se si assumono basse dosi di aspirina o altri farmaci che possono aumentare il rischio di malattie di stomaco e intestino (vedere paragrafo "Altri medicinali e PAIDOFEN"). Durante il trattamento con tutti i FANS, in qualsiasi momento, con o senza sintomi di preavviso o precedente storia di gravi eventi gastrointestinali, possono verificarsi sanguinamento, ulcerazione e perforazione dello stomaco o dell'intestino, che possono essere fatali. Pertanto informi il medico di qualsiasi sintomo gastrointestinale non comune (soprattutto sanguinamento gastrointestinale) in particolare nelle fasi iniziali del trattamento. Se si verifica sanguinamento o ulcerazione gastrointestinale, sospenda il trattamento con PAIDOFEN e contatti il medico;
- soffre o ha sofferto di una malattia infiammatoria dell'intestino (colite ulcerosa, morbo di Crohn) poiché tali malattie possono peggiorare (vedi paragrafo "Possibili effetti indesiderati");
- se sta assumendo medicinali che potrebbero aumentare il rischio di ulcera o sanguinamento, come medicinali utilizzati per trattare l'infiammazione e alcune malattie del sistema immunitario (corticosteroidi orali), anticoagulanti come il warfarin, medicinali che possono avere un effetto antiaggregante come l'aspirina, medicinali per trattare la depressione (inibitori selettivi del reuptake della serotonina) (vedere paragrafo "Altri medicinali e PAIDOFEN");
- ha malattie del cuore (ipertensione non controllata, insufficienza cardiaca congestizia, cardiopatia ischemica accertata, malattia arteriosa periferica) o ha sofferto di ridotto afflusso di sangue al cervello (ictus), o se pensa che il bambino possa essere a rischio per queste condizioni (per esempio se ha la pressione alta, se ha elevati livelli di zuccheri (diabete) o di grassi nel sangue o se fuma). I medicinali come PAIDOFEN possono essere associati ad un lieve aumento del rischio di infarto del cuore o di ridotto afflusso di sangue al cervello: il rischio è più probabile ad alte dosi. Non superi la dose o la durata del trattamento raccomandate;
- soffre o ha sofferto di pressione alta e/o grave malattia del cuore (insufficienza cardiaca) poiché, in associazione alla terapia con FANS, sono state riportate ritenzione di liquidi, pressione alta e gonfiore (edema);
- manifesta reazioni cutanee (dermatite esfoliativa, sindrome di Stevens–Johnson e necrolisi tossica epidermica). Interrompa il trattamento con Paidofen e contatti il medico alla prima comparsa di eruzioni cutanee, lesioni della mucosa o qualsiasi altro segno di ipersensibilità (vedere paragrafo "Possibili effetti indesiderati").

Gli effetti indesiderati possono essere minimizzati con l'uso della dose minima efficace per la durata di trattamento più breve possibile necessaria per controllare i sintomi.

Usi PAIDOFEN con cautela ed informi il medico se lei o il suo bambino:

- ha sofferto in passato di problemi allo stomaco o all'intestino come ulcerazioni, perforazioni o sanguinamenti. Se il suo bambino è in trattamento con altri medicinali che possono causare problemi a stomaco ed intestino, il medico potrà prescrivergli medicinali che proteggono lo stomaco (misoprostolo o inibitori di pompa protonica) (Vedere il paragrafo “Altri medicinali e PAIDOFEN”);
- soffre di asma. PAIDOFEN può causare in questo caso problemi di respirazione;
- presenta problemi nella coagulazione del sangue;
- soffre di malattie dei reni, del cuore, se ha la pressione del sangue alta o se è in trattamento con medicinali chiamati diuretici. In questi casi possono manifestarsi gravi problemi ai reni (riduzione critica della funzione renale, nefrotossicità o ritenzione di fluidi);
- soffre di malattie del fegato;
- è disidratato (ad esempio per febbre, vomito o diarrea). In questo caso, il suo bambino dovrà essere reidratato prima dell'inizio e nel corso del trattamento.

In caso di trattamenti prolungati con PAIDOFEN prolungati deve prestare particolare attenzione ed avvertire immediatamente il medico se compaiono:

- segni o sintomi di ulcerazioni o sanguinamenti dello stomaco o dell'intestino;
- i segni o sintomi di problemi al fegato;
- i segni o sintomi di danni ai reni;
- disturbi alla vista (vista offuscata o ridotta, aree di cecità completa o parziale, alterazioni della percezione dei colori);
- segni o sintomi di meningite, un'infezione grave delle meningi. I sintomi possono essere febbre, tensione alla nuca, mal di testa, vomito e disorientamento. L'ibuprofene, raramente può causare meningite asettica; questa infezione è più frequente in persone che soffrono di lupus eritematoso sistemico o altre malattie del collagene (Vedere il paragrafo “Possibili effetti indesiderati”).

### **Anziani**

Questo medicinale è indicato per i bambini, tuttavia è possibile che venga utilizzato per gli anziani.

Se è anziano può manifestare più facilmente alcuni effetti indesiderati come emorragie e perforazioni dello stomaco o dell'intestino, anche gravi, in seguito al trattamento con medicinali come PAIDOFEN. Questi effetti possono manifestarsi soprattutto ad alte dosi di PAIDOFEN o se ha sofferto in passato di ulcere, emorragie e perforazioni dello stomaco o dell'intestino (Vedere il paragrafo “Possibili effetti indesiderati”).

Se è anziano prenda la dose più bassa possibile di questo medicinale. Nelle persone anziane è raccomandato l'utilizzo di medicinali che proteggono lo stomaco (misoprostolo o inibitori di pompa protonica).

Informi il medico se manifesta problemi allo stomaco o all'intestino, soprattutto se ha sofferto in passato di ulcere, emorragie e perforazioni dello stomaco o dell'intestino.

### **Bambini e adolescenti**

Nei bambini e negli adolescenti disidratati esiste il rischio di alterazione della funzionalità renale.

### **Altri medicinali e PAIDOFEN**

Informi il medico o il farmacista se sta prendendo, ha recentemente preso o potrebbe prendere qualsiasi altro medicinale.

PAIDOFEN può influenzare o essere influenzato da altri medicinali, in particolare informi il medico o il farmacista se lei/il suo bambino sta assumendo:

- altri medicinali utilizzati per trattare il dolore, per abbassare la febbre e/o per curare l'infezione (antinfiammatori non-steroidi, FANS compresi inibitori della COX-2 o acido acetilsalicilico). In

questo caso tali associazioni vanno evitate poiché aumentano il rischio di possibili effetti indesiderati;

- medicinali utilizzati per trattare l'infiammazione e alcune malattie del sistema immunitario (corticosteroidi);
- medicinali utilizzati per trattare le infezioni causate da batteri (antibiotici chinolonici);
- medicinali che hanno un effetto anticoagulante (vale a dire sostanze che fluidificano il sangue impedendo la formazione di coaguli, es. aspirina/acido acetilsalicilico, warfarin,);
- medicinali utilizzati per il trattamento della depressione come gli inibitori selettivi del reuptake della serotonina;
- medicinali antidiabetici per trattare alti livelli di zucchero nel sangue (sulfaniluree);
- un medicinale per trattare le infezioni causate da virus (ritonavir);
- medicinali che modulano la risposta immunitaria (tacrolimus e ciclosporina);
- un medicinale utilizzato nella cura del cancro e dei reumatismi (metotressato);
- un medicinale utilizzato per malattie mentali (litio);
- un medicinale utilizzato per il trattamento delle infezioni da HIV (zidovudina);
- un medicinale utilizzato per trattare la gotta (probenecid);
- medicinali che riducono la pressione alta (ACE-inibitori come captopril, betabloccanti come atenololo, antagonisti dell'angiotensina II come losartan) e diuretici.
- 

Anche altri medicinali possono influenzare o essere influenzati dal trattamento con PAIDOFEN. Pertanto, consulti sempre il medico o il farmacista prima di usare PAIDOFEN con altri medicinali.

Durante il trattamento con PAIDOFEN, il medico dovrà tenere sotto controllo il livello di idratazione e la funzione dei reni dopo aver iniziato la terapia con un altro medicinale.

#### **PAIDOFEN con cibi e bevande**

Vedere Paragrafo 3 (Come usare Paidofen).

#### **Gravidanza e allattamento**

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno chiedi consiglio al medico o al farmacista prima di prendere questo medicinale.

È improbabile che bambine di età inferiore a 12 anni vadano incontro a gravidanza o allattino al seno. In tale eventualità bisogna tenere presente che l'assunzione di PAIDOFEN può avere effetti gravi e dannosi sul feto come rischio di aborto e malformazioni (durante le prime fasi di gravidanza), tossicità per polmoni, cuore e reni del feto, problemi di sanguinamento e problemi al momento del parto (durante gli ultimi 3 mesi di gravidanza).

#### **PAIDOFEN contiene:**

-

##### **- maltitolo liquido.**

Se il medico le ha diagnosticato una intolleranza ad alcuni zuccheri, lo contatti prima di somministrare questo medicinale.

Può avere un lieve effetto lassativo.

Il valore calorico del maltitolo è di 2,3 kcal/g.

##### **- sodio**

Questo medicinale contiene 30,45 mg di sodio (componente principale del sale da cucina) per ogni dose da 7,5 ml di sospensione. Questo equivale a 1,53% dell'assunzione massima giornaliera raccomandata con la dieta di un adulto.

##### **- sodio benzoato**

Questo medicinale contiene 2,5 mg di sodio benzoato per ogni dose da 2,5 ml equivalente a 1mg/ml.

Il sodio benzoato può aumentare l'ittero (ingiallimento della pelle e degli occhi) nei neonati fino a 4 settimane di età.

### 3. Come usare PAIDOFEN

Usi questo medicinale seguendo sempre esattamente quanto riportato in questo foglio o le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

Questo medicinale può causare dolore o bruciore allo stomaco. Questi disturbi allo stomaco possono essere ridotti assumendo il medicinale a stomaco pieno.

La dose giornaliera raccomandata è scelta in base al peso e all'età del bambino.

Nei bambini di età compresa tra 3 e 6 mesi limitare la somministrazione a quelli di peso superiore ai 5,6 kg.

Se il suo bambino è un lattante e ha un'età compresa tra i 3 mesi e i 12 anni, somministri il medicinale utilizzando la siringa dosatrice presente nella confezione.

Sulla siringa è presente una scala graduata con le tacche per i diversi dosaggi. La tacca da 2,5 ml corrisponde a 50 mg di ibuprofene e la tacca da 5 ml corrisponde a 100 mg di ibuprofene.

La dose giornaliera raccomandata di 20-30 mg per kg di peso corporeo, suddivisa 3 volte al giorno ad intervalli di 6-8 ore può essere somministrata sulla base dello schema che segue.


<b>Peso corporeo</b>	<b>Età</b>	<b>Dose singola in ml</b>	<b>Numero massimo di somministrazioni/giorno</b>
5,6 – 7 Kg	3 – 6 mesi	2,5 ml	3 nelle 24 ore
7 – 10 Kg	6 – 12 mesi	2,5 ml	
10 – 15 Kg	1 – 3 anni	5 ml	
15 – 20 Kg	4 – 6 anni	7,5 ml (5 ml + 2,5 ml)	
20 – 28 Kg	7 – 9 anni	10 ml	
28 – 43 Kg	10 – 12 anni	15 ml	

In caso di febbre causata da una vaccinazione, può scegliere la dose indicata sopra in base al peso. Somministri una dose singola del medicinale e, se necessario, somministri un'altra dose dopo 6 ore. Non somministri al suo bambino più di due dosi nelle 24 ore. Consulti il medico se la febbre non diminuisce.

Questo medicinale è indicato per trattamenti per brevi periodi di tempo. Consulti il medico se i sintomi persistono per più di 3 giorni. Se il suo bambino ha un'età inferiore a 6 mesi, consulti il medico se i sintomi persistono dopo 24 ore di trattamento.

Per utilizzare la siringa dosatrice, segua le seguenti istruzioni:

- 1 – Sviti il tappo spingendolo verso il basso e girandolo verso sinistra.
- 2 – Introduca a fondo la punta della siringa nel foro del sottotappo.
- 3 – Agiti bene.
- 4 – Capovolga il flacone, quindi, tenendo saldamente la siringa, tiri delicatamente lo stantuffo verso il basso facendo defluire la sospensione nella siringa fino al raggiungimento della tacca, stampata sullo stantuffo, corrispondente alla dose desiderata.
- 5 – Rimetta il flacone in posizione verticale e rimuova la siringa ruotandola delicatamente.
- 6 – Introduca la punta della siringa nella bocca del bambino, ed eserciti una lieve pressione sullo stantuffo per far defluire la sospensione.
- 7 – Dopo l'uso avviti il tappo per chiudere il flacone e lavi la siringa con acqua calda. Lasci asciugare tenendola fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.



**Se prende/dà al suo bambino più PAIDOFEN di quanto deve**

**Se ha preso più Paidofen di quanto deve o se il suo bambino ha assunto questo medicinale per errore, contatti sempre un medico o l'ospedale più vicino allo scopo di ricevere un parere sul rischio e consigli in merito alle azioni da intraprendere.**

**I sintomi possono comprendere nausea, mal di stomaco, vomito (con eventuale presenza di tracce di sangue), mal di testa, ronzio nelle orecchie, confusione e movimenti incontrollati degli occhi. A dosaggi elevati, sono stati segnalati sonnolenza, dolore al petto, palpitazioni, perdita di coscienza, convulsioni (soprattutto nei bambini), debolezza e vertigini, sangue nelle urine, sensazione di freddo al corpo e problemi respiratori.**

Inoltre, si possono manifestare anche: sanguinamento gastrointestinale, diarrea, stato di eccitazione, svenimento, abbassamento della pressione del sangue (ipotensione), diminuzione o aumento dei battiti del cuore (bradicardia o tachicardia).

Se assume dosi significativamente elevate di ibuprofene può manifestare gravi danni a carico dei reni e del fegato.

I sintomi di un sovradosaggio possono manifestarsi entro 4 – 6 ore dall'assunzione di ibuprofene.

**PAIDOFEN**

**Se dimentica di usare PAIDOFEN**

Non usi una dose doppia per compensare la dimenticanza della dose.

#### **4. Possibili effetti indesiderati**

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Se il bambino manifesta uno dei seguenti effetti indesiderati **INTERROMPA** il trattamento con PAIDOFEN e si rivolga al medico:

- gravi alterazioni della pelle e delle mucose caratterizzate da eruzioni, arrossamento, prurito e bolle (dermatiti bollose ed esfoliative che includono eritema multiforme, sindrome di Stevens-Johnson e necrolisi tossica epidermica);
- reazioni allergiche, anche gravi, che possono comprendere: orticaria, prurito, porpora, gonfiore di viso, bocca e gola (angioedema), difficoltà a respirare (broncospasmo o dispnea), alterati battiti del cuore (tachicardia), bassa pressione del sangue (ipotensione), anafilassi, shock e peggioramento dell'asma;
- meningite asettica con sintomi come disorientamento, mal di testa, nausea, vomito, torcicollo e febbre (più frequente se il bambino è affetto da lupus eritematoso sistemico o altre collagenopatie).

Si possono manifestare i seguenti effetti indesiderati:

- Effetti di natura gastrointestinale, come: ulcere peptiche (dello stomaco e del primo tratto dell'intestino), perforazioni o emorragia gastrointestinale, a volte mortale, in particolare negli anziani.
- Reazioni anafilattoidi come orticaria, anche associata a gonfiore del viso (angioedema), shock, sindrome caratterizzata da dolore addominale, febbre, brividi, nausea e vomito, difficoltà di respirazione (broncospasmo).
- Secchezza degli occhi e della bocca, formazione di lesioni sulle gengive (ulcere gengivali), irritazione e infiammazione della mucosa del naso (rinite).
- Disturbo della pelle con formazione di vesciche e bolle (eruzioni vescicolo-bollose), orticaria, irritazione della pelle (eritema multiforme, dermatite esfoliativa, dermatite da fotosensibilità).
- Caduta dei capelli (alopecia).
- Difficoltà di respirazione (broncospasmo, dispnea, apnea).
- Depressione, difficoltà a dormire (insonnia), difficoltà di concentrazione, disturbi dell'umore (labilità emotiva), sonnolenza.
- Infiammazione del cervello (meningite asettica).
- Convulsioni.
- Disturbi dell'udito e della vista.
- Infiammazione del fegato (epatite), alterazione del funzionamento del fegato che si manifesta con colorazione gialla della pelle e della parte bianca degli occhi (ittero), alterazione delle analisi del fegato, alterazioni del funzionamento del fegato (necrosi epatica, insufficienza epatica).
- Infiammazione del pancreas (pancreatite), dell'intestino (duodenite) e dell'esofago (esofagite).
- Grave disturbo ai reni e al fegato (sindrome epato-renale).
  
- Insufficienza renale acuta nei soggetti con preesistente significativa compromissione della funzione renale, problemi ai reni (necrosi papillare, necrosi tubolare, glomerulonefrite, alterazione delle analisi relative al funzionamento dei reni, aumento della necessità di urinare (poliuria), infezione delle vie urinarie (cistite), presenza di sangue nelle urine (ematuria)).
- Accidenti cerebrovascolari (ictus).
- Diminuzione della pressione del sangue (ipotensione).
- Alterazione del funzionamento del cuore (insufficienza cardiaca congestizia in soggetti con funzione cardiaca compromessa).
- Aumento dei battiti del cuore (palpitazioni).
- Alcuni problemi del sangue (neutropenia, agranulocitosi, anemia aplastica, anemia emolitica con possibile positività di un tipo di analisi specifica del sangue chiamata test di Coombs positivo, eosinofilia, riduzione dell'emoglobina e dell'ematocrito, pancitopenia).
- Diminuzione dei livelli delle piastrine (piastrinopenia), che può essere associato a un disturbo della pelle caratterizzato da sanguinamento (porpora).
  
- )
- Nausea, vomito, diarrea, flatulenza, stitichezza, disturbi della digestione (dispepsia), dolore addominale, presenza di sangue nelle feci (melena) e nel vomito (ematemesi).
- Infiammazione della bocca con formazione di lesioni (stomatiti ulcerative).
- Peggioramento di alcuni disturbi dell'intestino (colite e morbo di Crohn).
- Infiammazione dello stomaco (gastrite), dolore allo stomaco e sensazione di bruciore.
- Vertigine, mal di testa (cefalea), irritabilità, percezione di ronzii nell'orecchio (tinnito).
- Gravi disturbi della pelle (reazioni bollose inclusa sindrome di Stevens-Johnson e necrolisi tossica epidermica).
- Eruzioni cutanee (anche di tipo maculo-papulare), prurito.
- È possibile che si verifichi una reazione cutanea grave nota come sindrome DRESS. I sintomi della DRESS comprendono: eruzione cutanea, febbre, gonfiore dei linfonodi e aumento degli eosinofili (un tipo di globuli bianchi)

- Riduzione dell'appetito.
- Infiammazione del cervello (meningite asettica) se già soffre di malattie del sistema immunitario (lupus eritematoso sistemico, malattie del sistema connettivo); i sintomi della meningite sono tensione della nuca, mal di testa, nausea, vomito, febbre e senso di disorientamento
- Gonfiore dovuto ad accumulo di liquidi in una parte del corpo (edema).
- Aumento della pressione del sangue (ipertensione).
- Riduzione del funzionamento del cuore (insufficienza cardiaca).
- Diminuzione dell'eliminazione dei liquidi (ritenzione dei fluidi) che generalmente risponde prontamente all'interruzione del trattamento).

L'uso di ibuprofene, specialmente ad alte dosi (2400 mg/die), può essere associato a un modesto aumento del rischio di attacco cardiaco (infarto del miocardio) o ictus.

### **Segnalazione degli effetti indesiderati**

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo: <http://www.agenziafarmaco.gov.it/content/come-segnalare-una-sospetta-reazione-avversa>. Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

## **5. Come conservare PAIDOFEN**

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla confezione dopo "Scad.". La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Il periodo di validità dopo la prima apertura del flacone è 6 mesi.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chiedi al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

## **6. Contenuto della confezione e altre informazioni**

### **Cosa contiene PAIDOFEN Bambini 100mg/5ml sospensione orale gusto fragola senza zucchero**

- Il principio attivo è ibuprofene. Ogni ml di sospensione contiene 20 mg di ibuprofene.
- Gli altri componenti sono: acido citrico monoidrato, sodio citrato, acesulfame di potassio, gomma xantana, sodio benzoato, aroma fragola, maltitolo liquido, glicerina, acqua depurata.

### **Cosa contiene PAIDOFEN Bambini 100mg/5ml sospensione orale gusto arancia senza zucchero**

- Il principio attivo è ibuprofene. Ogni ml di sospensione contiene 20 mg di ibuprofene.
- Gli altri componenti sono: acido citrico monoidrato, sodio citrato, acesulfame di potassio, gomma xantana, sodio benzoato, aroma arancia, maltitolo liquido, glicerina, acqua depurata.

### **Descrizione dell'aspetto di PAIDOFEN e contenuto della confezione**

Ogni confezione contiene un flacone color ambra da 150 ml di sospensione orale con tappo con chiusura a prova di bambino ed una siringa dosatrice.

### **Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio**

DMG Italia S.r.l.  
Via Laurentina Km.26.700  
00071 Pomezia (RM)  
Italia

### **Produttore**

Special Product's Line S.p.A.  
Via Fratta Rotonda Vado Largo, 1  
03012 Anagni (FR)  
Italia

**Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il:**

Luglio 2018