Florberry® bustine

Integratore alimentare a base di **mirtillo rosso (cranberry)**, ***Lactobacillus paracasei* Lpc 37**, ***Lactobacillus paracasei* B21060**, **Frutto-oligosaccaridi (FOS)** ed **Arabinogalattano (AG)**.

INGREDIENTI

Frutto-oligosaccaridi; arabinogalattano; fruttosio; estratto di mirtillo rosso (*Vaccinium Macrocarpon Aiton*, frutti) titolato al 7,2% in proantocianidine; aromi; fibra vegetale; antiagglomerante: biossido di silicio;; *Lactobacillus paracasei* Lpc 37; *Lactobacillus paracasei* B21060; correttore di acidità: acido citrico anidro; edulcorante: sucralosio.

PROPRIETA'

Il mirtillo rosso contenuto in Florberry® (cranberry) aiuta a mantenere la salute del sistema urinario.

Florberry® agisce in modo combinato su *Escherichia coli* (tra le cause principali di IVU) sfruttando le qualità del cranberry e del probiotico associato.

Le **IVU (infezione delle Vie Urinarie)** sono causate per circa il 95% dei casi da ceppi di *Escherichia coli* in grado di aderire selettivamente ai recettori delle cellule uroteliali mediante molecole (adesine) poste all'estremità di particolari formazioni a fasci, definite pili o fimbrie. Le **proantocianidine (PACs)** contenute nel **cranberry** agiscono su *Escherichia coli*, tra le cause principali delle infezioni del tratto urinario, riducendone *in vitro* la patogenicità. Contemporaneamente, la componente **probiotica di Florberry®**, riequilibra la microflora intestinale impedendo la colonizzazione dei batteri patogeni nel colon, frequente sorgente autogena dei germi responsabili delle IVU. Questo aspetto è di particolare importanza se si considera che nelle IVU, soprattutto quelle femminili ricorrenti, i batteri colonizzano inizialmente il colon, quindi, attraverso la zona periuretrale/vaginale, risalgono le vie urinarie infettando la vescica e, in alcuni casi, i reni. Risulta pertanto estremamente importante impedire che batteri patogeni colonizzino ed alterino la microflora intestinale.

CARATTERISTICHE di FLORBERRY® bustine

Florberry® bustine è un integratore alimentare a base di cranberry. Una bustina di **Florberry®** garantisce l'apporto di **36 milligrammi di proantocianidine (PACs)**. Inoltre, il formulato apporta non meno di **5 miliardi di cellule vive di *Lactobacillus paracasei* (Lpc 37 e B21060)** e oltre 2 grammi di fibre dotate di attività prebiotica sia nei confronti dei ceppi presenti che in generale nei confronti delle specie batteriche utili e benefiche che fanno parte della microflora autoctona intestinale.

L'assunzione regolare di **Florberry®** bustine aiuta a mantenere in salute il sistema urinario ed intestinale.

DOSE GIORNALIERA

1-2 bustine al giorno

MODALITA' D'USO

Versare il contenuto di 1 bustina in circa ½ bicchiere di acqua a temperatura ambiente, mescolare ed assumere immediatamente dopo la preparazione.

Dopo aver versato il prodotto in acqua, si consiglia di mescolare molto accuratamente con un normale cucchiaino; un lieve intorbidimento della soluzione non è indice di alterazione ma della naturale sedimentazione dei componenti del prodotto.

Per una maggiore efficacia si consiglia di assumere Florberry® la sera, prima di coricarsi o al mattino a digiuno.

E' bene ricordare che per favorire il flusso urinario ed eliminare i batteri causa dell'infezione è opportuno bere almeno 1,5 – 2 litri di acqua distribuiti nel corso della giornata.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI	per 100 g	per bustina da 4,15 g
Valore energetico	342,2 kcal	14,2 kcal
	1437,8 kJ	59,67 kJ
Proteine	0,84 g	0,03 g
Carboidrati	61,53 g	2,55 g
di cui zuccheri	23,60 g	0,98 g
Grassi	1,17 g	0,05 g
di cui acidi grassi saturi	0,4 g	0,02 g
Fibre alimentari	33,0 g	1,37 g
Sale	0,97 g	0,04 g
<i>Apporti medi dei componenti funzionali</i>		
<i>Lactobacillus paracasei</i> Lpc 37	non meno di 96 miliardi U.F.C.	non meno di 4 miliardi U.F.C.
<i>Lactobacillus paracasei</i> B21060	non meno di 24 miliardi U.F.C.	non meno di 1 miliardo U.F.C.
Frutto-oligosaccaridi	27,23g	1,13 g
Arabinogalattano	24,10 g	1 g
Mirtillo rosso (cranberry)	12,05 g	500 mg
pari a proantocianidine (PACs)	0,87 g	36 mg

CONFEZIONE

Florberry® è disponibile in confezioni da 10 bustine monodose da 4,15 g.

AVVERTENZE

- Florberry® non presenta controindicazioni o effetti collaterali se non in soggetti sensibili ai componenti del prodotto.
- Florberry® non è indicato in bambini al di sotto dei 3 anni.
- **Gravidanza:** anche se il consumo di proantocianidine in quantità alimentari è ben tollerato in gravidanza, senza effetti collaterali su madre e feto, non esistono, al momento, studi clinici che possano con certezza consigliarlo o controindicarlo in gravidanza. Pertanto, si consiglia di attenersi alle indicazioni del medico curante.
- **Possibili interazioni con farmaci:** sono state segnalate in letteratura possibili interazioni tra cranberry e Warfarin. Sebbene il dato sia controverso, si consiglia comunque di controllare l'indice INR dei soggetti in terapia anticoagulante.
- Non superare la dose consigliata dal medico.
- Può contenere tracce di proteine del latte.
- Senza glutine e lattosio.
- Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni.

Integratore alimentare con zucchero ed edulcorante

NORME DI CONSERVAZIONE

Conservare **Florberry**[®] in luogo asciutto ed al riparo dalla luce diretta, ad una temperatura non superiore a 25°C.

La data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato in confezione integra.

Prodotto nello stabilimento di via B. Marche 1/C Istrana (TV) per conto di **Bracco S.p.A.**