

Maalox

RefluRAPID®

Dispositivo medico

SANOFI

BLOCCA IL REFLUSSO RIDUCE IL BRUCIORE

SOSPENSIONE ORALE

Senza Glutine
Senza Lattosio

INDICAZIONI D'USO

Maalox RefluRAPID è un dispositivo medico ad azione meccanica a base di Sodio Alginato, bicarbonato di sodio, sodio carbonato e calcio carbonato, formulato per svolgere 3 azioni sinergiche: bloccare il reflusso acido, ridurre il bruciore e proteggere la mucosa dell'esofago.

Maalox RefluRAPID dispositivo medico è indicato per il trattamento del reflusso gastro-esofageo al fine di ridurre i sintomi ad esso correlati, come ad esempio: bruciore, pirosi gastrica in gravidanza, esofagite da reflusso, rigurgito acido, cattiva digestione, tosse e infiammazione laringo-faringea.

COME AGISCE

Maalox RefluRAPID

dispositivo medico agisce grazie all'azione dell'Alginato di Sodio e dei carbonati in esso contenuti.

A contatto con l'acido dello stomaco, l'alginato di sodio reagisce formando un gel mentre i carbonati rilasciano anidride carbonica permettendo al gel di galleggiare e di formare così un tappo che impedisce meccanicamente la risalita dei succhi gastrici verso l'esofago. La presenza del bicarbonato contribuisce inoltre a ridurre l'iperacidità di stomaco.

COMPOSIZIONE

Sodio Alginato, Bicarbonato di Sodio, Sodio Carbonato, Calcio Carbonato, acqua depurata, aroma, acido poliacrilico, propil-p-idrossibenzoato di sodio, metil-p-idrossibenzoato di sodio, saccarina sodica.

MODO D'USO

Adulti e bambini al di sopra dei 12 anni: 1 o 2 bustine (10 ml cadauna) dopo i pasti principali e al momento di coricarsi. Agitare prima dell'uso.

Bambini al di sotto dei 12 anni: deve essere somministrato solo su consiglio medico. Per le modalità di assunzione del prodotto seguire attentamente le indicazioni raccomandate dal medico.

AVVERTENZE

Tenere fuori dalla portata e dalla vista dei bambini. Non utilizzare in caso di grave insufficienza renale. Non utilizzare in caso di ipersensibilità nei confronti dei componenti. In caso di reazioni indesiderate sospendere il trattamento e consultare il medico. Il prodotto può interferire con l'assorbimento di medicinali ad uso orale. Si consiglia pertanto di consultare il medico in caso di assunzione contemporanea di medicinali ad uso orale, che devono in ogni caso essere somministrati ad una distanza di almeno 2 ore. Qualora non si dovesse notare alcun miglioramento dopo 7 giorni di trattamento, si consiglia di consultare il medico. Il prodotto può causare una sensazione di gonfiore. Il rispetto delle modalità d'uso riportate riduce la probabilità che accada. Questo prodotto contiene quantitativi di sodio

98,23 mg (4,27 mmoli) e calcio 32 mg (0,8 mmoli) per bustina (10 ml). Consultare il medico nel caso in cui si segua una dieta povera di sale, come ad esempio in caso di ipertensione, problemi cardiaci, epatici e renali ed in caso di ipercalcemia, nefrocalcinosi e calcoli renali recidivi contenenti calcio. Per donne in gravidanza o in allattamento si consiglia di sentire il parere del medico.

CONSERVAZIONE

Non usare il prodotto dopo la data di scadenza indicata sulla confezione e sulle bustine.

Conservare ad una temperatura compresa fra gli 8°C ed i 25°C, al riparo dalla luce e lontano da fonti di calore. Non refrigerare.

DISPOSITIVO MEDICO

 0373



Biofarma S.p.A.
Via Castelliere 2
33036 Mereto di Tomba (UD)

Distributore:

Sanofi S.p.A.
Viale L. Bodio, 37/B
IT-20158 Milano

Confezioni disponibili:
20 bustine monodosi da 10 ml

Data ultima revisione:
Marzo 2015

MaaReRPD-002

FRONTE

RETRO